これからの
がん治療

押味和夫

がんの治療法

- 手術
- 放射線
- 抗がん剤治療

化学療法

分子標的療法

免疫療法

抗がん剤の種類

- アルキル化剤・・・シクロホスファミド など
- 代謝拮抗剤・・・メソトレキセート など
- 微小管阻害剤・・・ビンクリスチン など
- トポイソメラーゼ阻害剤・・・エトポシド など
- 細胞毒性を有する抗生物質・・・ドキソルビシン など
- ホルモン剤・・・男性ホルモン、女性ホルモン、副腎皮質ホルモン
- 分子標的薬

がん細胞が持つ
異常な分子を選択的に攻撃する

分子標的療法

- 正常細胞への影響は少ないので副作用は起きにくい
- 次々と新しい分子標的薬が誕生

2001年は？

- Imatinib (グリベック®) 国内承認
- Rituximab (リツキサン®) 国内承認
- Trastuzumab (ハーセプチン®) 国内承認

「日本の分子標的療法元年」

ただし1995年に *all-trans* retinoic acid (ベサノイド®) がAPLに対し市販されている

分子標的治療薬の種類

- がん細胞の増殖シグナルを阻止
- がん細胞の死(apoptosis)を早める
- がん抑制遺伝子の機能回復
- DNA損傷を修復するポリメラーゼを阻害
(例・PARP阻害剤)
- 免疫系を介してがん細胞を破壊する
- がん細胞を養う血管の新生を阻害

がんはなぜ発生するのか？

遺伝子は核のなかにある

染色体・遺伝子とは？

染色体に起こる変化

慢性骨髄性白血病のフィラデルフィア染色体(1960年発見)

フィラデルフィア染色体

22番染色体が短い

正常染色体

ABL

9

22

BCR

B

異常染色体

9⁺

融合遺伝子

BCR-ABL

22⁻

フィラデルフィア染色体

BCR-ABL遺伝子が

つくる異常な蛋白

白血球を増やす

白血球が死ななくなる

分子標的薬 **イマチニブ** の作用機序

飲む薬イマチニブによる 慢性骨髄性白血病の治療成績

細胞増殖と細胞死

同じ遺伝子異常が 異なる種類の**がん**を起こす

Protein Kinase プロテインキナーゼ

- タンパク質分子にリン酸基を付加する(リン酸化する)酵素

Protein Kinase

プロテインキナーゼ

- 細胞内の30%ものタンパク質が protein kinase による変化を受け、細胞の増殖・分化などに関わる信号の伝達に重要な役割を果たす。
- Protein kinase はアミノ酸のうち、主にセリン、スレオニン、チロシン残基をリン酸化する。protein kinase がリン酸化するアミノ酸の99%以上はセリン、スレオニンである(セリン/スレオニンキナーゼ)。
- しかし、0.1%に満たないチロシンのリン酸化(チロシンキナーゼ)の方が生物学的に重要なケースが多い。

Tyrosine Kinase チロシンキナーゼ

- 少なくとも90種類のTK
(チロシンキナーゼ)
がある
- 受容体型 TK 58種類
- 非受容体型 TK
32種類

AML細胞の FLT3

細胞膜受容体 (レセプター)

外部からのシグナル分子 = リガンド

FLT3 in AML

acute myeloid leukemia 急性
骨髄性
白血病

- ◆ FLT3は80%以上のAML患者で発現している
- ◆ AML患者の半数でFLT3の過剰発現を認める
- ◆ 25-30%の患者で、7-33個のアミノ酸の internal tandem duplication (ITD) がFLT3の JMドメインに起こる
- ◆ TK2ドメインの点突然変異D835が7%の患者で起こる

再発または治療抵抗性の FLT3変異 AMLに対する gilteritinib (FLT3 阻害薬) の成績

肺がん

1) 小細胞がん		10-15%
2) 非小細胞がん	扁平上皮がん	25-30%
	腺がん	50-60%
	大細胞がん	5%

腺がんの遺伝子異常

肺がん全体の3割が
EGFR 遺伝子変異

肺がん

細胞膜

細胞内シグナル
伝達

EGFR:
epidermal
growth
factor
receptor

上皮
成長
因子
受容体

EGFRチロシンキナーゼ阻害薬

Gefitinib (Iressa®)、Erlotinib (Tarceva®)

未治療進行期NSCLC N Engl J Med 2010;362:2380

改良型EGFRチロシンキナーゼ 阻害薬 osimertinib

未治療進行期NSCLC N Engl J Med 2020;382:41

乳がんのHER2

- human epidermal growth factor receptor 2
- EGFR2 と呼ばれる
- 受容体型チロシンキナーゼ
- 約25%の乳がんで過剰発現している
- 過剰発現していると予後不良
- このレセプターに対するモノクローナル抗体
trastuzumab (Herceptin[®]),
pertuzumab (Perjeta[®])

HER2陽性乳がんに対する抗体療法

N Engl J Med 2001;344:783-792

HER2陽性乳がんに対する抗体療法

N Engl J Med 2012;366:109-119

毒素が付いた抗体による 残存病変の治療

細胞死

Blebs

Blebs

Small blebs form;
the structure of the
nucleus changes.

Small blebs form.

The nucleus begins

ネクローシス
壊死
Necrosis

アポトーシス
Apoptosis

in the blebs.

The cell membrane
ruptures and releases
the cell's content;
the organelles are
not functional.

The cell breaks into
several apoptotic
bodies;
the organelles are
still functional.

Necrosis

Apoptosis

Apoptosis

アポトーシス

apo 離れる

ptosis 落ちる

木の葉がパラパラと落ちる

オタマジャクシの尾がなくなってカエルになる

Programmed cell-death

**18番染色体の
bcl-2 遺伝子の過剰発現**
→アポトーシスの抑制
→細胞が死ななくなる

濾胞性リンパ腫

t(14;18)(q32;q21)

細胞増殖と細胞死

Bcl-2 の過剰発現

- 非ホジキンリンパ腫
- 白血病
- 多発性骨髄腫
- 腺癌 (前立腺癌、大腸癌、胃癌、肺癌など)
- 扁平上皮癌
- 小細胞がん
- 神経芽腫
- 肉腫

年齢別の急性骨髄性白血病の発生頻度

米国 2000-2003年

発病5年後の急性骨髄性白血病の 年齢別生存率 米国 1996-2002年

こういう治療をすると

**venetoclax +
hypomethylating
agent** 低(脱)メチル化薬

高齢者の急性骨髄性白血病
(AML) も治るのではないか

65歳以上の未治療AMLに対する venetoclax + hypomethylating agent

がん発症の遺伝的素因

- 遺伝性腫瘍 家族性腫瘍 がんのなかの 5-10 %
- がん抑制遺伝子 (体の細胞ががんになるのを防ぐ働き)
- この遺伝子に変異があるとがんになる
- 常染色体優性遺伝
- 発生するがんの種類
- 大腸がん、乳がん、卵巣がん、骨軟部肉腫、皮膚がん、ウィルムス腫瘍、脳腫瘍、網膜芽細胞腫、多発性内分泌腫瘍症
- 遺伝カウンセリング

がん抑制遺伝子の**変異**と遺伝性腫瘍

2つあるがん抑制遺伝子の片方が変化（**変異**）して、正しく働かなくなっても、まだ大丈夫

両方とも**変異**すると、その細胞はがんになる

一般の人の体の細胞

① →

② →

人生ここからスタート!

遺伝性腫瘍の患者さんの体の細胞

① →

人生ここからスタート!

がん抑制遺伝子

Retinoblastoma 網膜芽細胞腫

眼球内に発生する悪性腫瘍
2~3歳ころまでに見られる

がん抑制遺伝子

Tumor suppressor gene

機能: 細胞周期チェックポイント制御

転写因子制御

転写

DNA修復 など

RB 細胞周期の調節

p53 転写因子 Li-Fraumeni 症候群

BRCA1 DNA修復 家族性乳がん・卵巣がん

BRCA2 DNA修復 家族性乳がん・卵巣がん

などなど

Angelina Jolie

乳癌と卵巣癌の発生が高くなるとされる遺伝子「BRCA1」に生まれつき変異があるとして、乳癌予防のために両乳腺を切除。さらに卵巣と卵管を切除。

がん抑制遺伝子 のプロモーター領域 に多い
CpGアイランドのシトシンがメチル化されると
がん抑制遺伝子の転写は抑えられる

azacitidine
Vidaza®

decitabine
Dacogen®

Cytidine

5-Methyl-
cytidine

5-Aza-
cytidine

5-Aza-2'-
deoxycytidine

**Methyltransferase inhibitors,
Hypomethylating agents**

ドライバー変異

タンパク質をコードする遺伝子は 20,000 以上あるが、そのうち 300-600 の遺伝子に起こる**ドライバー変異** (driver mutation) が**がん**を引き起こす

多段階発がん

ドライバー変異 と パッセンジャー変異

ドライバー変異

がん細胞の増殖を促進する遺伝子変異

パッセンジャー変異

がん細胞の増殖を促進しない遺伝子変異

がん細胞内での
遺伝子変異の
起こり方

同じがんでも転移巣ごとに
遺伝子配列は異なっている？

Cancer Stem Cells がん幹細胞

がんゲノム医療(1)

- **ゲノム**; 全ての遺伝情報
- **がんゲノム医療**; 主にがんの組織を用いて、多数の遺伝子を同時に調べ、がんの原因となった遺伝子の異常を探し、その異常に効果が期待できそうな治療を行う医療。

がんゲノム医療(2)

- 2019年6月から、100種類以上の遺伝子検査を、がんゲノム医療中核拠点病院などで、健康保険を使って受けることができるようになった。
- 保険で検査が受けられるのは、固形がんで、①標準治療がない患者(原発不明がん、希少がん、小児がん)、②標準治療が終わった患者、③検査後、治療が受けられる状態の患者。

北海道大学病院における がん遺伝子パネル検査とは？

最低3回受診、2ヶ月かかる

がん遺伝子パネル検査

北大病院(tel 011-706-7040)、札医大、
道がんセンター、旭医大、市立函館病院

〈表〉保険診療で行われている2種類のがん遺伝子
パネル検査 ※1人1回のみ、どちらかの検査を選んで受ける

	NCC オンコパネル	ファウンダー ションワン
検査対象遺伝子数	114	324
検査対象融合遺伝子数	12	36
検査期間(最短)	4~6週間	4~5週間
検査料金	保険診療の料金56万円の1~3割が 自己負担額。高額療養費の支給対象 になる可能性がある	

Personalized Medicine

個別化医療

疾患を予防、診断、治療するために個人の遺伝子や蛋白、環境に関する情報を活用する医療形態のこと

Precision Medicine

精密（高精度）医療

患者の個人レベルで最適な治療方法を分析・選択し、それを施すこと。最先端の技術を用い、細胞を遺伝子レベルで分析し、適切な薬のみを投与し治療を行うこと

Precision Oncogenomics

しかし新たな問題が！

- **感染症**との闘いで経験したのと同じ問題が出現

感染症：抗生物質が効かない菌の出現

がん：抗がん剤が効かないがん細胞の出現

抗がん剤治療(まとめ)

- まだまだ不十分
- これから先、分子標的療法が主
- 分子標的療法が効かない大きな理由が、次から次へと起こる遺伝子変異
- この変異にどう対応するか
- がん幹細胞をもっと研究すべき
- がん細胞周囲の微小環境をもっと研究
- 医学と薬学の共同作戦をさらに進める

医療費についての問題点

- 分子標的治療薬が効く**がん**の種類・患者はまだまだ少ない
- これからも研究費・開発費はたっぷりかかる
- **薬の値段**は高くなる
- **国民皆保険制度**は維持できるか